

Bent Konradsen
Karatmagervej 8
9300 Sæby

Sagsnr.: 2013-52-90
Deres ref.:
Udtaget: 31-01-2013
Modtaget: 06-02-2013
Analyse påbegyndt: 06-02-2013
Besvaret: 07-03-2013
Sagsansvarlig: Gitte Larsen
Telefon: +45 35886180
E-mail: gitl@vet.dtu.dk

Laboratoriesvar

Ejer/besætning: Findested:, North 6349527 East: 595920

Prøvenr. Prøveinformation

1 21,8 kg., rådyr, han, kadaver(e),

Anamnese:

Fundet dødt på stranden af hundelufter.

Patologisk anatomisk undersøgelse

1
Kadaver(e) Voksen han.
Ved undersøgelsen fandtes kadaveret i god tilstand(dvs. egnet til obduktion)
Kadaveret var afmagret, med sparsomme fedtdepoter.
Hårlaget var upåfaldende, dog sås en del pelslus.
Hjertet fandtes upåfaldende. Lungerne havde mørkerøde områder bagtil i venstre lunge.
Leveren fandtes let forstørret, butrandet, og normal af farve og tekstur.
Mavesækken fandtes med rigeligt indhold. Maveindholdet fandtes upåfaldende og bestod af grønne plantedele. Vom papillerne var lidt små.
Tarmkanalen fandtes med rigeligt indhold. Tarmindehold og tarmslimhinde fandtes upåfaldende.
Tarmindeholdet var fast formet i endetarmen, dog lidt slimet.
I øvrigt sås sand og muslinger i pelsen, luftrøret og lunge bronchierne.
Kraniet var skævt med skæv underkæbe, hvilket medførte et stort overbid. Tænderne var slidte pga "kæbe-skævheden".

Histopatologisk undersøgelse

1 Organer I lungen ses hyperæmi (øget blodtilførsel) og lavgradig hyperplasi (forøgelse) af det bronchiøle associerede lymfoide væv.
I lymfeknuden ses neutrofile granulocytter (hvide blodlegemer) i sinussystemet.
Tarmen er delvist kadaverøs, der er ingen histologiske fund.
Hjernen er upåfaldende.

Fund af hvide blodlegemer i lymfeknudens sinussystem er uspecifikt og viser bare at der har været betændelse i det område lymfeknuden har dræneret.

Parasitæg/-oocyster v. McMaster

1 Tarm	Capillariaæg (hårorm), 10 æg/g, lavgradig udskillelse Eimeria oocyster (coccidier), 1300 oocyster/g, moderat udskillelse #Lungeorm larve, påvist Nematodirusæg (tarmorm), 250 æg/g, moderat udskillelse Strongylideæg, 720 æg/g, massiv udskillelse Trichuris æg, 580 æg/g, moderat udskillelse
--------	--

Anvendt metode: Parasit undersøgelse af fæces ved McMaster teknik, V04-03-005

Ved McMaster teknik påvises æg af mave-tarmorm samt coccidioocyster. Positive og/eller negative fund er anført i ovenstående skema.

Konklusion

1 Kadaver(e)	Det har ikke været muligt at påvise den direkte dødsårsag. Ved obduktionen blev der ikke fundet skudsår eller hagl i dyret. Dyret var svækket pga. afmagring og stor parasit byrde. Det skæve bid vurderes ikke at have givet problemer, årsagen hertil kan være skade efter tidligere kamp, hvor brud på kæben er afhelet. Fund af sand og muslinger i luftveje skyldes nok at dyret blev fundet på stranden og hvor det var delvist begravet i sand.
-----------------	--

Vi takker for indsendelsen som indgår i laboratoriets overågning af sygdomme hos vildtlevende dyr.